

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

Ubiranei Oliveira Silva

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ INTRODUÇÃO

Conceitos de Lesão e Condição Cancerizável	
Lesão cancerizável (pré-câncer, pré-malignidade)	Tecido morfollogicamente alterado, mas com características benignas, que apresenta risco aumentado de transformação maligna, quando comparado à sua contraparte normal (p. ex., leucoplasia)
Condição cancerizável	Estado geral que não necessariamente altera o aspecto local do tecido, mas está associado a maior risco de desenvolvimento de câncer (p. ex., fibrose submucosa, disfagia sideropênica)

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ INTRODUÇÃO

Lesões e Condições Cancerizáveis Bucais	
Lesões cancerizáveis	Leucoplasia Eritroplasia
Condições cancerizáveis	Queilite actínica Fibrose submucosa bucal Líquen plano

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LEUCOPLASIA

- lesão pré-cancerosa mais comum (85%)
- sexo masculino
- diagnosticado acima 40 anos
- Etiologia: desconhecida
 - acomete 1% a 3% dos indivíduos adultos

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LEUCOPLASIA

- Características Clínicas
 - Não pode ser removida por raspagem
 - Assintomática

Apresentação Clínica das Leucoplasias	
<i>Tipo</i>	<i>Variantes clínicas</i>
Homogêneo	—
Não homogêneo	Nodular Eritroleucoplasia/ mosqueada Verrucosa proliferativa

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LEUCOPLASIA

Características Associadas a Maior Risco de Transformação Maligna

Forma não homogênea, especialmente a verrucosa proliferativa

Presença de displasia epitelial à histopatologia

Localização em assoalho bucal ou língua

Paciente não fumante

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LEUCOPLASIA

Diagnóstico

- Biopsia
- Citologia esfoliativa

Diagnóstico diferencial

- queimadura
- candidíase pseudomembranosa
- hiperkeratose focal
- líquen plano
- carcinoma verrucoso
- estomatite nicotínica
- nervo branco esponjoso
- mucosa mordiscada

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LEUCOPLASIA

- Tratamento
 - Uso de vitamina A
 - Bleomicina
 - Excisão cirúrgica, eletrocautério, criocirurgia, ablação a laser


LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA



Leucoplasia em dorso de língua

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

Abordagem clínica da Leucoplasia Oral



LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ ERITROPLASIA

- Etiologia desconhecida
- Características Clínicas
 - placa ou mácula eritematosa, assintomática, bem demarcada, textura aveludada e macia
 - predomina sexo masculino (Id. 55 – 74 a)
 - assoalho bucal, palato mole

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ ERITROPLASIA


- Características Histopatológicas
 - 90% apresentam displasia epitelial severa ou carcinoma *in situ* ou carcinoma espinocelular invasivo (5%)
- Diagnóstico diferencial
 - mucosites inespecíficas
 - candidíase eritematosa
 - lesões vasculares
 - sarcoma de Kaposi

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ ERITROPLASIA

- Tratamento
 - eliminação de fatores locais
 - criocirurgia, eletrocirurgia ou vaporização a laser
 - excisão cirúrgica

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA



Eritroplasia do assoalho da boca à esquerda

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ QUEILITE ACTÍNICA

- afeta principalmente o lábio inferior
 - exposição excessiva ao componente ultravioleta da radiação solar e ao fumo
 - transformação maligna: 6% a 10% dos casos
-
- Características Clínicas
 - afeta principalmente homens brancos
 - sinais de atrofia do vermelhão do lábio inferior, áreas eritematosas irregulares, evoluindo para ulceração, fissuras
 - ardência, ressecamento e descamação

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ QUEILITE ACTÍNICA

- Características Histopatológicas
 - elastose selar
 - hiperqueratose e atrofia evoluindo para displasia
- Tratamento
 - Biopsia é obrigatória
 - Uso de pomadas, fotoprotetores e corticosteroides
 - Cirurgia: vermelhectomia; 5 – fluorouracil tópico; criocirurgia; ácido tricloroacético e cirurgia a laser

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA



Queilite actínica

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ FIBROSE MUCOSA BUCAL

- enrijecimento das membranas mucosas
- relacionado predominantemente ao hábito de mascar a noz de areca (betel quid) acrescida de tabaco
- taxa de transformação maligna diferente em várias regiões

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ FIBROSE MUCOSA BUCAL

- Características Clínicas
 - Sintomas: queimação bucal; sialorréia; pigmentação
 - dificuldade para abertura da cavidade oral
 - mucosa com aspecto enrugado, pálido, superfície atrófica (banda fibrosa submucosa)
 - mucosa jugal, retromolar e palato mole (mais afetados)

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ FIBROSE MUCOSA BUCAL

- Tratamento
 - colagenase; corticosteroides
 - cirurgia
 - interferon gama

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LÍQUEN PLANO

- condição cancerizável (?)
- doença mucocutânea crônica
- etiologia obscura
- afeta entre 0,1% a 2% da população
- localização mais freqüente: mucosa jugal, gengiva e língua
- líquen plano x reação liquenóide
- diagnóstico: Biopsia

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

➤ LÍQUEN PLANO

- tratamento

 - corticoterapia

 - cauterização (ác. Tricloroacético)

 - bochecho com uréia e água destilada

 - vit. A

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA



Líquen plano reticular

Fonte: Brasilino, p. 259, 2001

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA



Líquen plano

Fonte: Brasilino, p. 259, 2001

LESÕES CANCERIZÁVEIS DA BOCA

- DISFAGIA SIDEROPÊNICA
- FUMO REVERSO